

CERVUS NIPPON
CERVO SIKA
CECO: JELEN SIKA
EN: SIKA DEER



DIFFUSIONE DEL SIKA IN REPUBBLICA CECA

Nel territorio della odierna Repubblica Ceca il cervo sika è stato introdotto alla fine del 1800 all'interno di riserve recintate per poi popolare le foreste aperte in seguito alla chiusura della riserva recintata di Manetin (nella regione di Plzen) a metà degli anni 30 del 1900. Oggi le zone di maggiore diffusione di questa specie di cervo sono la Boemia occidentale e la Moravia del Nord da dove il sika si sta espandendo nelle zone confinanti. La popolazione del cervo sika in RC è in continuo aumento (dai circa 2000 degli anni 80 ai circa 11000 esemplari stimati nel 2013) così come sono in aumento le zone dove è diffuso. Tutto questo malgrado gli intensi sforzi di contenimento mediante l'attuazione di precisi piani di abbattimento. Il sika è un cervo con una forte adattabilità alle diverse condizioni per cui pur preferendo le foreste di latifoglie e miste non ha avuto problemi a popolare le foreste di conifere ai piedi delle montagne. Il cervo sika, inoltre, può insediarsi anche in aree umide caratterizzate dalla presenza di canneti. Risulta meglio adattato alle aree cespugliate e/o ai boschi giovani, piuttosto che alle foreste mature.

ORIGINE DEL CERVO SIKA

Originario del sud-est asiatico (鹿 shika in giapponese significa cervo) il Cervo Sika (*Cervus nippon*) in passato era massicciamente presente in tutta l'Asia orientale (Giappone, Corea, Vietnam, parte centrale della Cina) e nella parte orientale dell'Unione Sovietica. Attualmente la specie è ancora molto diffusa in Giappone mentre in Cina presenta una distribuzione molto localizzata. Nell'areale di origine la specie è minacciata dalla perdita di habitat e dalla caccia, in particolare in Vietnam, Cina e Korea. In Vietnam e Taiwan la specie è cacciata sia per la carne che per il velluto del palco, che viene utilizzato nella medicina tradizionale. Nonostante sia in aumento in Giappone, qui come nella maggior parte dell'area originaria, la specie è minacciata dalla ibridazione con il *Cervus elaphus*, il cui allevamento era diffuso soprattutto in Giappone. La specie è classificata come "Least concern" dall'IUCN (IUCN Red List of Threatened Species). La sua introduzione in Europa risale alla fine del 800 e oggi la sua presenza in Europa è riscontrabile nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Germania, Polonia, Austria e Repubblica Ceca. Originariamente nel nuovo habitat europeo il sika era allevato solo nelle riserve recintate ma attualmente si trova anche libero in natura. .

CARATTERISTICHE DEL CERVO SIKA

Il cervo sika ha dimensioni corporee notevolmente più piccole del cervo nobile, simili a quelle di un palancone di daino. Il mantello estivo del sika è marrone castano con delle macchie bianche non ben definite, una striscia scura sulla schiena ed un ventre grigio chiaro. Il mantello invernale è grigio scuro e le macchie sono molto deboli o addirittura non si vedono.



Cervi Sika con mantello invernale

Il Sika ha una massa corporea egualmente bilanciata tra treno anteriore e posteriore. Lo specchio anale è bianco, a volte con una piccola striscia nera verticale ed una coda più lunga del cervo nobile. La coda è scura e contrasta con il bianco dello specchio anale. L'area delle ghiandole metatarsali è di colore bianco ed il muso corto che rientra quasi in un triangolo equilatero.

Lo sviluppo delle corna nel cervo Sika si arresta per lo più al livello di "sei-punte" o di "otto-punte". I primi fusti delle corna vengono fuori già nel marzo dell'anno seguente alla nascita, ma si arriva a sfregare le corna per toglierne il "velluto" solo in agosto (talvolta addirittura a metà ottobre). Maschi di parecchi anni che perdono le corna tra la metà di aprile e la fine di maggio, le sfregano tra la metà di luglio e l'inizio di settembre. Nel periodo dell'accoppiamento i sika adulti portano una splendida criniera. Il sika vive al massimo fino a 14-15 anni.



Cervo Sika con mantello estivo

COMPORTAMENTO

Di norma sedentario, il cervo sika compie modesti movimenti tra l'estate e l'inverno. L'organizzazione sociale è basata su branchi unisessuali per buona parte dell'anno, che si uniscono durante la stagione riproduttiva e in presenza di inverni particolarmente rigidi. Il sika è relativamente sedentario ed è di abitudini meno diurne del daino. Per il resto il suo comportamento durante il periodo dell'accoppiamento assomiglia a quello del cervo nobile, ma i gruppi sono in genere piccoli. Il periodo dell'accoppiamento dura molto a lungo, da settembre all'inizio di dicembre. Dopo 32 settimane di gestazione, le femmine partoriscono di regola un solo piccolo. I maschi in calore non emettono bramiti ma suoni simili ad un fischiottio. Dopo l'accoppiamento si formano branchi sia di maschi sia di femmine; i maschi più anziani sono spesso solitari. La maggior parte delle femmine si riproducono con successo a partire da un anno compiuto d'età.

ALIMENTAZIONE

Il cervo sika è classificabile prevalentemente come pascolatore, piuttosto che come brucatore. Pascola e ruminava foglie, erbe, graminacee, frutti di bosco e colture. Ad un regime alimentare incentrato sul consumo di foraggio, può tuttavia aggiungersi la brucatura di cespugli e cortecce. Analogamente al cervo nobile causa notevoli danni alla corteccia degli alberi. Durante la stagione invernale si nutre delle provviste di cibo lasciate dai guardacaccia (in ceco *mýslivci*).

PECULIARITÀ DELLA CACCIA AL CERVO SIKI

Il sika vive appartato, è sfuggente, calmo, resistente e conosce molto bene l'ambiente in cui vive. I cacciatori esperti sostengono che è tre o quattro volte più difficile da cacciare rispetto alle altre specie di cervo. La battuta di caccia, pertanto, è estremamente coinvolgente. Abbattere uno di questi cervi non è facile. Essi sono rinomati per essere difficilmente abbattibili con un colpo di fucile. Il pregio della preda oltre che nella regalità del trofeo sta nella carne deliziosissima e nella pelle che si ricopre di macchie durante la sua vita apprezzandosi di molto.



Gruppo di cervi Sika

LA STAGIONE DI CACCIA AL SIKI IN RC

Seconda la normativa vigente la stagione di caccia del cervo sika va dal 1 agosto al 15 gennaio.

**I MIGLIORI TROFEI DI CERVO SIKA (CERVUS NIPPON) IN EUROPA
NEL PERIODO 1973-2013**

Punteggi CIC Cervo Sika

MEDAGLIA DI BRONZO: CIC 225,00 – 239,99

MEDAGLIA D'ARGENTO: CIC 240,00-254,99

MEDAGLIA D'ORO: CIC 255 e oltre

POSIZIONE	ANNO CACCIA	LUOGO CACCIA	NAZIONE	CACCIATORE	PUNTI CIC
1	1984	N. Lancashire	Gran Bretagna	G.K. Whitehead	307,3
2	1976	Beverungen	Germania	F. Hake	307,3
3	1973	Beverungen	Germania	O. Menger	306,5
4	1981	Kladruby	Repubblica ceca	F. Kaiser	301,80
5	1984	Vogelsang	Germania	Ch. Petersen	299,3
6	1977	Lanes	Gran Bretagna	G.K. Whitehead	295,1
7	1978	Beverungen	Germania	F. Hake	294,9
8	1990	Čihána	Repubblica ceca	J. Beran	294
9	1985	Velké Meziříčí	Repubblica ceca	J. Košík	292,4
10	1979	Kozov	Repubblica ceca	Z. Ženožička	375,6

I MIGLIORI TROFEI DI CERVO SIKA IN REPUBBLICA CECA NEGLI ANNI 2000

POSIZIONE	LUOGO	CACCIATORE	ANNO	PUNTEGGIO	MEDAGLIA
1	Šipín	J. Řepa	2006	259,5	Oro
2	Hradiště	J. Novák	2009	250,9	Argento
3	Hradiště	M. Stařeček	2009	244,8	Argento
4	Hradiště	J. Churán	2009	242,8	Argento

