

PHASIANUS COLCHIDUS

FAGIANO COMUNE

CZ: BAŽANT OBEČNÝ

EN: PHEASANT



Esemplare adulto di fagiano comune ceco con collare

IL PHASIANUS COLCHIDUS DELLA REPUBBLICA CECA

Il fagiano comune che si trova attualmente in Repubblica ceca è il frutto dell'incrocio tra le varie sottospecie e variazioni di *phasianus colchidus* introdotte nel tempo negli allevamenti cechi e segnatamente:

Phasianus colchicus colchicus – fagiano comune senza collare, denominazione storica del cosiddetto “fagiano ceco” originario della Transcaucasia e introduzione nelle terre ceche nell’alto medioevo (non è possibile indicare con precisione il periodo)

Phasianus colchicus torquatus – fagiano comune con collare originario della Cina orientale e introdotto nelle terre ceche nella seconda metà dell’Ottocento

Phasianus colchicus mongolicus – in ceco *bažant obecný sedmirický* - originario della parte nord-occidentale del Turkistan e introdotto nelle terre ceche nella prima metà del Novecento

Phasianus (colchicus) versicolor – fagiano (comune) multicolore originario del Giappone e introdotto nelle terre ceche nella seconda metà dell’Ottocento

Phasianus colchicus formosanus – fagiano comune formoso, originario di Taiwan e introdotto nelle terre ceche a cavallo tra Ottocento e Novecento

Phasianus colchicus colchicus var. Tenebrosus – fagiano comune tenebroso, ingentilito in Inghilterra nella prima metà del Novecento e introdotto nelle terre ceche nella prima metà del

Novecento

Phasianus colchicus colchicus var. Isabellinum – fagiano comune flavo, probabilmente una variante spontanea del P.c. colchicus dell'Ungheria, introdotto nelle terre ceche nella prima metà del Novecento

DESCRIZIONE

Il fagiano ceco maggiormente tipico ha sul corpo un colorito bronzeo. La maggior parte dei fagiani attualmente allevati in Repubblica ceca ha sul collo il collare o almeno un suo accenno. Il fagiano originario ceco senza collare risulta essere scomparso a seguito delle continue ibridazioni tra le varie sottospecie. I fagiani si distinguono per la lunga coda la cui lunghezza varia tra 40-50cm (nelle femmine circa 30cm). Il fagiano adulto raggiunge il peso tra 1 e 1.8 kg (le femmine da 0.8 a 1.4kg). La gallina ha un colore grigio-marrone con una molteplicità di macchie scure su tutto il corpo. L'estensione dell'ala del maschio raggiunge fino a 27 cm (nella femmina fino a 23cm).



Gallina di Fagiano Comune

BIOLOGIA

Il periodo di calore inizia a marzo e dura circa due mesi. In questo periodo i maschi fanno dei suoni rumorosi durante tutto il giorno e difendono il proprio territorio davanti agli altri rivali. Per ogni maschio ci sono di solito 3-6 galline, il numero dipende dalla quantità di fagiani in una determinata località. Durante il mese di aprile le galline iniziano a fare i nidi e a deporre le uova. Il nido che di solito si trovano nelle boscaglie, ai lati delle strade dei boschi oppure su terreni non coltivati ha la forma di una fossetta piatta. Ogni nido contiene dalle 8 alle 14 uova ed il periodo d'incubazione dura dai 23 ai 25 giorni. Nel caso la raccolta di uova venga distrutta, la gallina provvede a farne un'altra ma con un numero dimezzato di uova.

ALIMENTAZIONE

I pulcini si nutrono prevalentemente di insetti e dei loro cacchioni integrando successivamente la loro alimentazione con una maggiore quantità di vegetali. La composizione dell'alimentazione dei fagiani adulti dipende dall'età, dalla stagione dell'anno e dalla disponibilità di cibo. A differenza dei pulcini i fagiani adulti si nutrono in prevalenza di vegetali e nella loro alimentazione si possono trovare semi di erbe, cereali, tuberi di patate, vari frutti, cacchioni di insetti, piccoli roditori, lumache e lucertole.. Ne deriva una notevole varietà ed eterogeneità dell'alimentazione.

HABITAT E DIFFUSIONE DEL FAGIANO COMUNE IN REPUBBLICA CECA

L'habitat ideale per il fagiano sono le pianure e le basse colline fino ai 500 metri sopra il livello del mare con alternanza di piccoli boschi e prati. E' diffuso in tutto il territorio della Repubblica ceca fino ai 900 metri dei monti Krkonoše al confine con la Polonia. La presenza più forte tuttavia si riscontra nelle pianure agricole con una sufficiente quantità di ripari tra l'erba alta dei prati o nei boschi. A partire dagli anni 70 si registra un crollo della popolazione di fagiani. Ancora nel 1970 sul territorio dell'allora Cecoslovacchia vennero cacciati 1,2 milioni di fagiani mentre tra gli anni 1985 e 1989 hanno nidificato solo 300-600 mila fagiani e nel periodo 2001-2003 si è verificato una drastica riduzione per arrivare a 150-300 mila pezzi. Per tale ragione il fagiano comune è stato inserito nella lista rossa di specie sotto osservazione.

LA STAGIONE DI CACCIA AL FAGIANO COMUNE IN REPUBBLICA CECA

La stagione di caccia al fagiano comune nelle foreste aperte va dal 1 novembre al 31 dicembre. Nelle bažantnice é possibile anche cacciare le galline fino al 31 gennaio.