

**Tetrao Urogallus**  
**Gallo Cedrone**  
**CZ: Tetřev Hlušec**  
**EN: Grouse**



*Esemplare maschio di Tetrao Urogallus*

### **DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA**

Il gallo cedrone vive nei boschi aghiformi dall'Europa occidentale fino al lago di Baikal. Il confine meridionale della sua zona passa dagli Urali meridionali, attraversa i Balcani e le Alpi arrivando fino ai Pirenei. Al nord è presente fino al confine delle foreste. La diffusione in Europa è nella maggior parte fatta di piccole popolazioni locali. In Repubblica ceca la sua presenza è limitata a piccoli territori sui monti Jeseniky, Krkonoše e soprattutto in Šumava al confine con la Baviera. Il gallo cedrone predilige grandi foreste aghiformi o miste con un sottobosco di cespugli eterogenei con molte piante di mirtilli, lamponi e mirtilli rossi. Nonostante l'impegno profuso nello stabilizzare le popolazioni rimanenti, il numero di galli cedroni in Repubblica ceca continua a diminuire. Anche il tentativo di allevare artificialmente i pulcini ha conseguito scarsi risultati e secondo le ultime stime sopravvivono solo tra i 150 ed i 200 capi.

### **DESCRIZIONE**

Il gallo cedrone presenta un forte dimorfismo tra maschio e femmina. Il maschio ha una lunghezza di 75-95 cm e pesa tra 3,7 e 4,5 kg. La femmina misura 58-68cm e pesa tra 1,8 e 2,4 kg. Il maschio ha un colore scuro con riflessi verdastri sul petto e due vistose macchie scapolari bianche. L'occhio è bruno, la membrana periculare rosso vivo ed il becco bianco-corneo. La femmina ha un colore bruno-grigiastro con sfumature rosse sul petto

## BIOLOGIA

Il comportamento del gallo cedrone durante il periodo degli amori è da sempre oggetto di studio degli etologi. Durante tale periodo il gallo cedrone pone in essere una danza detta “*parata*”, con la coda a ventaglio ed il capo all’indietro. Il tutto accompagnato da un canto che parte da uno scoppietto di crescente rapidità fino al cosiddetto arrotare, ovvero una serie di suoni fischiati che ricordano lo stridere di una lama sulla ruota di un arrotino. Non mancano movimenti rapidi della coda, delle ali e del corpo e saltelli sui rami con le tutte le piume rizzate. Durante l’ultima fase del canto non sente e non vede e diventa una facile preda. A fronte di una natura solitamente timida il maschio mostra un indole estremamente bellicosa e dando luogo a combattimenti anche estremamente cruenti per affermare la supremazia sul territorio. Le femmine accorrono numerose e una volta fecondate, depongono le uova in una buca del terreno al riparo. La madre per difendere le uova (ma anche i piccoli) esegue la “*parata di distrazione*”: si finge ferita e si trascina lontano facendosi inseguire, per distogliere l’attenzione del nemico dal nido.



*Femmina di Tetrao Urogallus*

Il periodo dell’accoppiamento va da aprile a maggio; dopo circa 25 giorni nascono dai 5 ai 14 pulcini e lo svezzamento avviene in autunno: i piccoli si dividono negli stormi a seconda del sesso maschile o femminile.

## ALIMENTAZIONE

L’alimentazione del gallo cedrone in estate comprende vegetali verdi, formiche, bacche e frutti di bosco (lamponi, fragole e mirtilli) mentre in inverno si nutre di gemme, aghi di conifere e germogli del sottobosco. Il gallo cedrone è un uccello schivo e pigro: passa gran parte dell’inverno sugli alberi e nella bella stagione sta a terra per cercare cibo.

## **IMPORTANZA PER LA CACCIA**

Si tratta di trofeo di pennuto molto richiesto per la sua particolare bellezza. La selvaggina della femmina è molto gustosa e delicata, quella del maschio stopposa e dura.

## **LA TUTELA DEL GALLO CEDRONE IN REPUBBLICA CECA**

Il gallo cedrone é incluso nella rossa degli uccelli in forte pericolo di estinzione per cui vale il divieto assoluto di caccia.

