

ANAS PLATYRHYNCHOS

GERMANO REALE

CZ: KACHNA DIVOKÁ

EN: MALLARD



Coppia di Germano Reale

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA

Il germano reale in Repubblica ceca nidifica praticamente su tutto il territorio fino alle montagne. La maggiore popolazione si trova negli stagni della Boemia del sud e della Moravia del sud. Nella stagione invernale parte delle anatre migra, la parte che rimane passa trascorre l'inverno sui corsi d'acqua che non ghiacciano. In Šumava si è verificata la nidificazione a 1200 metri, in Krkonoše sopra i 1400 m. Il numero della popolazione nidificante negli ultimi decenni è sceso da 60 000 a 40000 coppie. La popolazione nel 2011 è stata stimata in 250.000 capi. Cercano tutte le zone di acqua di ogni estensione e tipo incluse quelle periodicamente disidratate e alluvionate. Preferiscono le acque basse ricche di animali e con tante piante che forniscono loro cibo.

Il germano reale vive in tutta l'Europa con ad eccezione del Cipro ed in alcuni posti nell'Africa settentrionale. Il confine settentrionale della zona di diffusione del germano reale raggiunge l'inizio della tundra, il confine meridionale attraversa Cina settentrionale, il Kashmir, l'Afghanistan e l'Asia Minore. In Nord America nidifica dalla Alaska alla California. Sverna nelle zone meridionali della sua area arrivando talvolta fino alle zone tropicali di Africa e Indonesia.



Volo di Germani Reali in Moravia del Sud

DESCRIZIONE

Il Germano reale può raggiungere una lunghezza di 56 cm nel maschio e di 52 centimetri nella femmina, con un'apertura alare di 91-98 centimetri e un peso variabile tra i 700 e i 1.440 grammi. Presenta un disformismo sessuale assai accentuato per quanto riguarda la colorazione del piumaggio. Il maschio in livrea nuziale ha testa e collo verde scuro brillante ed un sottile collare bianco in contrasto con il nero del petto. Anche la coda è scura, con sfumature grigie e qualche tratto bianco. Il resto del corpo è grigio brillante, con riflessi argentati e altri più scuri. Al termine della stagione riproduttiva, in estate, le vecchie penne remiganti ed il timoniere indispensabili per il volo cadono per essere sostituite da nuove penne ed il germano reale assume un colore bruno con macchiette marroni scuro (simile a quello della femmina).

L'occhio è bruno chiaro, il becco giallo-verde ed i piedi arancio vivo. La femmina è in prevalenza bruna, con una varietà di sfumature dal beige al marrone. I fianchi sono grigio perla e il ventre è bianco. Il sottocoda è nero e la coda bianca con copertura nero-verdastra. Il dorso è grigio-bruno e le ali grigio scuro con un'evidente banda verde-blu. Il becco è di colore ardesia. Gli arti sono di colore rosso-arancione. Gli anatroccoli, che nascono privi di penne e piume, sono ricoperti di un soffice piumino bicolore, petto e ventre gialli, dorso e fianchi marroni con alcune macchie gialle, testa gialla con sopracciglio e chioma marroni.

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO

Le coppie si iniziano a formare in autunno non appena il maschio ha la livrea nuziale completa. Il nido è costruito solitamente a terra. La deposizione delle uova inizia a marzo-aprile. Le uova possono essere da 6 a 16 di colore verdastro anche se possono assumere variazioni di colore che vanno dal fulvo-verde al grigio-verde, al panna o giallo chiaro tendente al bianco. Dopo un mese nascono i piccoli che lasciano il nido appena nati e incominciano a volare dopo un paio di mesi.

ALIMENTAZIONE

Praticamente onnivora, si ciba di tutto ciò che riesce a trovare immergendo il becco sott'acqua o razzolando sul terreno. I sistemi di alimentazione e la dieta del germano variano notevolmente in base all'ambiente in cui risiede. La sua facilità di adattamento gli permette di alimentarsi in diversi modi. Il 90% della dieta consiste comunque in sostanze vegetali per il restante 10% di insetti, molluschi, crostacei, anelidi, anfibi e, sia pure raramente, di piccoli pesci. In linea generale nel periodo primaverile entrano nella dieta del germano porzioni sempre più elevate di insetti, quindi fonte proteiche animali, per il restante periodo dell'anno sono invece i semi ad essere prevalenti.

STAGIONE DI CACCIA ALL'OCA SELVATICA IN REPUBBLICA CECA

In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia all'oca selvatica va dal 1° settembre fino al 30 novembre.