

ANSER ALBIFRONS

OCA LOMBARDELLA

CZ: HUSA BĚLOČELA

EN: WHITE FRONT GOOSE



Oca Lombardella

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA

Si tratta di una specie artica nidificante in Eurasia e Nord America. Passa l'inverno in Europa Centrale fino al Mediterraneo. Nella Repubblica ceca regolarmente prolunga la sua presenza e specialmente nel sud della Moravia passa anche l'inverno. Nella zona di svernamento più grande, Novomlýnské nadržé il numero delle oche che vi trascorrono l'inverno varia tra i 10 000 e i 25000 capi. L'oca lombardella nidifica nelle zone acquitrinose delle foreste, sulle rive dei fiumi e sulle isole dei laghi: Ha delle tendenze della nidificazione comune.

DESCRIZIONE

Si tratta di un'oca di minori dimensioni rispetto all'Oca selvatica. A differenza delle oche selvatiche, granaiole e zamperosee presentano una grande macchia bianca alla base del becco, delle irregolari strisce nere sul petto e le zampe arancioni. Esistono due sottospecie, la siberiana albifrons con il becco rosa e la groenlandese flavirostris con il becco arancio. Il margine superiore dei fianchi è bianco così come il basso ventre ed il sottocoda. I giovani non hanno la fronte bianca e le barre nere sul ventre ed il piumaggio è più scuro; i giovani da soli possono essere confusi con un'oca selvatica ma sono più piccoli ed hanno zampe arancioni.



Oche Lombardelle in Boemia del Sud

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO

L'oca lombardella ha caratteristiche biologiche simili all'oca selvatica che si richiamano. Il nido viene costruito nel mese di marzo solo dalla femmina con erbacce e licheni con rivestimento di piume. La femmina depone poi dalle 4 alle 6 uova color bianco sporco. Dopo 27-28 giorni nascono i piccoli di cui si occupano entrambi i genitori. In Repubblica ceca le oche lombardelle arrivano nei mesi di ottobre e novembre.

Nel volo é spesso un esemplare gregario che segue altre specie di oche, in primis l'oca selvatica. Se le condizioni climatiche lo consentono vi rimane, altrimenti parte per le terre calde del sud Europa o del Nord Africa. Durante il pascolo é frequente trovarla insieme ad altre specie di oche. Durante l'estate é possibile sentire il loro caratteristico kjo jok.

ALIMENTAZIONE

L'oca lombardella come le altre specie di oca predilige i vegetali. Ricerca soprattutto i campi seminati dove raccoglie le granaglie e le giovani pianticine di grano o mais.



Oche Lombardelle al pascolo

STAGIONE DI CACCIA ALL'OCA LOMBARDELLA IN REPUBBLICA CECA

In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia all'oca selvatica va dal 16 agosto al 15 gennaio.