

ANSER ANSER

OCA SELVATICA

CZ: HUSA VELKÁ

EN: GREY LAG GOOSE



Oca Selvatica in volo

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca l'oca selvatica nidifica regolarmente nelle zone dei laghi della Boemia meridionale e della Moravia, di meno nella zona del Polabi e della Moravia centrale. Alla fine degli anni 80 del secolo scorso si censirono nel territorio nella Repubblica ceca circa 670 coppie di oche selvatiche. Negli ultimi anni, specialmente nella Moravia del Sud, le popolazioni sono drasticamente diminuite. Mentre tra gli anni 1989-1994 si contavano nel bacino di Novomlýnská nádrž nella Moravia del sud 50-172 coppie, negli anni 1995-1998 erano solo 44-75 coppie e nel 1999 solo 19 coppie. Tale diminuzione é ascrivibile senza ombra di dubbi ad una legislazione sbagliata che consentiva la caccia alle oche anche nei periodi di primo insediamento delle prime coppie nei nidi.

L'oca selvatica si trova presso stagni e paludi. Ottima migratrice, vola in grandi stormi di forma triangolare. Si adatta bene ai diversi ambienti. Socievole e gregaria, si può addomesticare facilmente. Un tempo l'oca selvatica nidificava praticamente in tutta la zona paleo-artica. Nella parte occidentale di tale zona è stata in gran parte sterminata mentre nell'Europa centrale è sopravvissuta solo in numeri molto più bassi di quelli della popolazione originaria. Grandi numeri si raggiungono ancora oggi nella parti asiatiche (Kazakistan, Mongolia).



Famiglia di Oche Selvatiche

DESCRIZIONE

L'oca selvatica è l'antenata dell'oca domestica. Ha testa, collo e fianchi bruno grigiastri, petto grigio chiaro tendente al camoscio verso l'addome. Il sottocoda è bianco. Il becco, largo e robusto, ha una colorazione arancione con unghia terminale rosea. Le zampe sono rosso-arancio.

L'oca Selvatica si differenzia nelle due sottospecie occidentale e orientale:
- *Anser anser anser* L. (*Anser cinereus*): in Europa occidentale (Inghilterra, Germania e Olanda);

- *Anser anser rubirostris*: nelle zone più orientali dell'Europa.

-

Le due sottospecie sono molto simili: la sottospecie orientale presenta il becco rosa e un'orlatura del piumaggio sul dorso e sulle ali più chiaro e marcato, inoltre la colorazione della coda è più bianca. Il maschio è leggermente più grande della femmina. I giovani sono simili agli adulti con piumaggio più scuro. Le dimensioni medie dell'oca selvatica sono 750-900 mm di lunghezza, apertura alare di 150-170 mm e peso dai 3 ai 3,5 kg.

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO

Le oche vivono in coppie monogame stabili, cercano il partner nel periodo che va dai due ai tre anni di vita e qualora lo perdano non ne cercano altri. Occorre considerare che le oche possono raggiungere i 60 anni di vita. Le oche sono molto guardinghe e prestano grande attenzione a quello che succede intorno a loro. La vita delle oche selvatiche a dire il vero è focalizzata sul tentativo di salvare se stesse e la propria famiglia. Pochi giorni dopo la nascita entrambi i genitori portano i piccoli nell'acqua e sulla terraferma. Uno dei genitori è sempre in allerta su cosa accade nei dintorni. I piccoli sono indipendenti dalla nascita e crescono velocemente.



Stormo di Oche Selvatiche in Moravia del Sud

Alla nascita sono coperti da rade piume color fuliggine che nel corso delle prime otto settimane di vita arrivano a coprirli interamente. Circa dopo dieci settimane dalla nascita sono in grado di volare.

Alla fine dell' estate le oche selvatiche si riuniscono in grandi stormi che iniziano ad alzarsi tra gli stagni e piano piano si preparano a partire per i luoghi caldi dove svernano. La popolazione dell'Europa centrale – compresa quella della Repubblica ceca – migra verso i laghi salmastri costieri del Nord Africa, in primo luogo Algeria e Tunisia, attraversando l'Italia.

Per la nidificazione le oche scelgono dei laghi con abbastanza giunco nelle cui vicinanze si trovino prati o campi con abbondanza d'acqua. Al di fuori del periodo della nidificazione cercano grandi laghi per riposarsi e campi estesi di mais per nutrirsi.

ALIMENTAZIONE

L'oca selvatica raccoglie il cibo sul terreno o in acqua. Predilige la terraferma ed i grandi spazi essendo un gran pascolatrice. Si nutre di giorno volando al mattino presto ed al crepuscolo. È dotata di una buona corsa e nuota molto bene. Si nutre di piante erbacee, piante acquatiche, germogli, semi, granaglie, tuberi. Il suo robusto becco le consente di arrivare a faglie e steli inaccessibili ad altri uccelli. In primavera estate si nutre soprattutto delle parti tenere dei vegetali, compresi i frutti. In autunno-inverno delle parti sotterranee dei vegetali, in primo luogo rizomi e tuberi.

STAGIONE DI CACCIA ALL'OCA SELVATICA IN REPUBBLICA CECA

In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia all'oca selvatica va dal 16 agosto al 15 gennaio. Le oche si cacciano al mattino quando si alzano in volto per andare alla ricerca di cibo o alla sera, aspettando vicino agli stagni che si abbassino per la notte. I cacciatori non possono cacciare nelle immediate vicinanze degli specchi d'acqua. Nascosti in mezzo agli alberi aspettano che si affacci uno stormo di oche nella migrazione della sera. La caccia alle oche selvatiche non è per nulla semplice e questo aumenta il grado di soddisfazione in caso di esito positivo.